

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada Acuosa

Insecticida y/o Acaricida Agrícola **RSCO-INAC-0110-019-014-033**

Este producto está formulado a base del insecticida Carbofurán, el cual es un plaguicida sistémico utilizado como insecticida, acaricida y nematocida de amplio espectro, que pertenece al grupo químico de los carbamatos.

CUFURAN L-350® presentado en forma de suspensión acuosa para aplicar al suelo es ideal para aplicaciones dirigidas al sistema radicular de las plantas, ya que su modo de acción sistémico y translaminar, con movimiento acropétalo, residual, penetra por raíz y hojas y tiende a distribuirse al interior de toda la planta, protege tejido nuevo producido después de aplicación. En Insectos: actúa por contacto, ingestión e inhalación, penetra a través de la cutícula del insecto durante la aplicación o con residuos sobre las partes tratadas, por la ingestión de tejido tratado o por la inhalación de los vapores.

CUFURAN L-350® Actúa interfiriendo los impulsos nerviosos por inhibición de la acetilcolinesterasa y posee una vida media en suelos de 30 a 60 días. Se degrada principalmente por acción microbiológica.

CUFURAN L-350® no es compatible con productos de naturaleza alcalina; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Qúfuran

carbofuran L-350

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada Acuosa

Insecticida y/o Acaricida Agrícola

RSCO-INAC-0110-019-014-033

Cultivo	Plaga	Dosis L/ Ha	Observaciones
Alfalfa (28)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp) Gusano de alambre (<i>Melanotus</i> spp) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp) Picudo egipcio (<i>Hypera brunneipennis</i>)	4.0 -6.0	Aplicación al suelo; incorporar antes la siembra o si es posterior a ésta deberá darse un riego si el suelo no está húmedo. Aplicar inmediatamente después del corte.
Arroz (40)	Barrenador del tallo (<i>Chilo loftini</i> , <i>Rupella</i> spp.) Chicharritas, falsas Chicharritas (<i>Sogata oryzicola</i> , <i>Sogata cubana</i> , <i>Sogata furcifera</i>) Picudo acuático (<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>)	1.5 -2.5	Al fondo del surco o a lo largo de las hileras antes del primer aporque.
Cacahuete (60)	Gusano saltarin (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>) Gusano de alambre (<i>Melanotus</i> spp)	3.0 -4.0	Aplicar al follaje 30 días después de emergido. Esperar tres días si se aplicó propanilo aplicar éste 3 semanas después de aplicar CUFURANL-350 .
Cafeto (25)	Minador de la hoja (<i>Leucoptera coffeella</i>) Escamas (<i>Lepidosaphes</i> spp, <i>Aonidiella</i> spp) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp) Nematodos (<i>Meloidogyne</i> spp y <i>Pratylenchus</i> spp.)	200 ml/100 L Agua	En semilleros incorpore 5 a 10 cm. Antes de sembrar. En almácigos aplicar 3 cm de profundidad. En plantaciones nuevas o establecidas aplicar al suelo o en la cara que cubre el follaje.
Caña De Azúcar (17)	Mosca pinta o salivazo (<i>Aeneolamia postica</i>) Barrenadores (<i>Diatraea</i> spp. y <i>Elasmopalpus lignosellus</i>) Nematodos (<i>Meloidogyne</i> spp y <i>Pratylenchus</i> spp)	1.0 -2.5 2.5 -3.0 5.0 -6.0	Aplicar al suelo en la siembra o sobre la soca después del corte. A lo largo del surco y cerca de la semilla.

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®



Qúfuran

carbofuran

L-350

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada Acuosa

Insecticida y/o Acaricida Agrícola

RSCO-INAC-0110-019-014-033

Cultivo	Plaga	Dosis L/ Ha	Observaciones
Calabacita (21) Melón, Pepino, Sandía (60)	Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp) Gusano trozador (<i>Agrotis</i> spp) Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp) Doradilla (<i>Diabrotica</i> spp) Nematodos (<i>Meloidogyne</i> spp, <i>Pratylenchus</i> spp y <i>Xiphinema</i>) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.)	4.0 -5.0	Aplíquese a la siembra o a lo largo de las hileras camas. En surco al nacer el cultivo o a lo largo de la hilera o antes del aporque. Regar para activar el producto
Chile (21)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp) Gusano trozador (<i>Agrotis</i> spp.) Pulga saltona (<i>Chaetocnema</i> spp.) Nematodos (<i>Nacobbus</i> spp.)	3.0 -4.0	Aplique o incorpore antes del trasplante a una profundidad de 5 a 10 cm y riegue.
Fresa (60)	Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp) Pulgón de la fresa (<i>Pentatrichopus fragaefolii</i> , <i>Pentatrichopus jabobi</i> , <i>Pentatrichopus thomasi</i>) Nematodos (<i>Dorylaimus</i> spp.)	3.0 -4.0	Aplique o incorpore antes del trasplante a una profundidad de 5 a 10 cm y riegue.
Maíz, Sorgo (30)	Barrenador de tallo (<i>Diatraea grandiosella</i>) Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano trozador (<i>Agrotis</i> spp.) Gusano de alambre (<i>Melanotus</i> spp.) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Chicharrita (<i>Dalbulus maidis</i>) Nematodos (<i>Pratylenchus</i> spp., <i>Tylenchorhynchus</i> spp., <i>Aphelenchus</i> spp.) Gusano de la raíz (<i>Diabrotica</i> spp.) Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	2.0 -2.5 1.5 -2.0 4.0 -5.0	Aplique al suelo en banda al fondo del surco, al momento de la siembra alrededor de la semilla. Aplicación al follaje de las plantas. Aplique al suelo en banda al fondo del surco, al momento de la siembra incorpore

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Qúfuran

carbofuran L-350

Insecticida y/o Acaricida / Solución Concentrada Acuosa

Insecticida y/o Acaricida Agrícola

RSCO-INAC-0110-019-014-033

Cultivo	Plaga	Dosis L/ Ha	Observaciones
Vid (60)	Filoxera (<i>Phylloxera vitifoliae</i>) Nematodos (<i>Aphelenchus</i> spp., <i>Criconemoides</i> spp. y <i>Xiphinema</i> spp., <i>Pratylenchus</i> spp.)	15 a 20 L/ha riego Por goteo 8 –10 L/ha	Aplice sobre la superficie de las cuando aparezcan los primeros brotes á retoños incorpórese y riéguese. No aplique en suelos con pH superior a 8.
Plátano (60)	Picudo negro (<i>Cosmopolites sordidus</i>), Picudo rayado (<i>Metamasius hemipterus</i>), Nematodo nodulador (<i>Radopholus similis</i>)	400 a 600 ml/100 L de agua. Aplicar un litro de la mezcla /unidad de producción	Aplicar al suelo cubriendo el área que ocupa la cepa. Realizar un riego después de la aplicación o aplicar durante la temporada de lluvias. Repetir la aplicación cada 4 a 5 meses.
Trigo (60)	Pulgón de la raíz (<i>Rhopalosiphum ruffiabdominalis</i>) Pulgón del cogollo (<i>Rhopalosiphum maidis</i>), Pulgón del follaje (<i>Schizaphis graminum</i>) Nematodo nodulador (<i>Pratylenchus tornei</i>)	2a 3 en banda	Aplicar al fondo del surco cuando se siembra bajo este sistema. En sistema de boleo hacer dos aplicaciones a intervalos de 30 días.
Papa (60)	Pulga saltona (<i>Eptitrix cucumeris</i>) Gallina ciega (<i>Phyllophaga</i> spp.) Pulgón de follaje (<i>Macrosiphum solanifolii</i>) Chicharrita (<i>Empoasca</i> spp.) Nematodo nodulador (<i>Meloidogyne</i> spp. y <i>Pratylenchus</i> spp.)	1.0 -2.0 3.0 -4.0 5.0 -6.0	Aplicación foliar. Aplique al suelo en banda al fondo del surco, al momen- to de la siembra incorpore.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicació

Presentación: Botella PET 950 ml y garrafa HDPE de 5 L.