

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Insecticida / Concentrado Emulsionable

Insecticida Agrícola **RSCO-INAC-0124-020-009-038**

DECKER 400® formulado a base de un insecticida organofosforado el cual contiene 400 g de dimetoato como ingrediente activo, el cual es posible utilizar en una amplia gama de cultivos: ornamentales, frutales, hortalizas e industriales.

DECKER 400® es un insecticida con acción de contacto e ingestión, muy eficaz en el control de insectos masticadores, minadores y chupadores. Dimetoato es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, lo cual produce un acumulación de la acetilcolina en la membrana post-sináptica y causa la muerte del insecto al afectar el sistema nervioso central y sus funciones vitales.

Para el manejo adecuado de la resistencia a este tipo de insecticidas se recomienda respetar las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido del producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes mecanismos de acción y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS. Este producto no se debe de mezclar con productos que tengan una reacción alcalina fuerte o productos a base de cobre o azufre.

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Insecticida / Concentrado Emulsionable

Insecticida Agrícola RSCO-INAC-0124-020-009-038

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)
Nogal (21)	Pulgón Amarillo (<i>Monellia costalis</i>) Pulgón negro (<i>Melanocallis caryaefoliae</i>)	125 ml/100L de agua
Peral (28)	Pulgón verde (<i>Aphis pomi</i>)	125 ml/100L de agua
Ornamentales (28)	Pulgones (<i>Aphis</i> spp.) Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	125 ml/100L de agua
Chile (SL) Jitomate (Tomate) (7)	Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp., <i>Chaetocnema</i> spp.) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Pulgones (<i>Aphis gossypii</i>) Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Trips (<i>Thrips</i> spp, <i>Frankliniella</i> spp) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.)	1.0
Lechuga (14)	Pulgones (<i>Aphis</i> spp, <i>Brevicoryne</i> spp.)	1.0
Melón (3)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Pulgón del melón (<i>Aphis gossypii</i>) Pulgón (<i>Myzus persicae</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.)	0.75 1.0-1.5
Papa (SL)	Pulgón (<i>Macrosiphum solanifolii</i>)	1.0
Cártamo (14)	Chinche <i>Iygyus</i> (<i>Lygus lineolaris</i>) Chinche rápida (<i>Creontiades</i> spp.)	1.0

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Sifatec®

Decker

dimetoato

400 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable

Insecticida Agrícola
RSCO-INAC-0124-020-009-038

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)
Soya(21)	Chicharritas (<i>Eutettix tenellus</i>) Chinche lygus (<i>Lygus lineolaris</i>) Chinche café (<i>Euschistus servus</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>)	1.0
Limón Naranja y Toronja (15)	Pulgón negro (<i>Toxoptera aurantii</i>) Piojo harinoso (<i>Planococcus citri</i>) Mosquita blanca (<i>Dialeurodes citri</i>) Trips de los cítricos (<i>Scirtothrips citri</i>)	175-200 ml/100L de agua.
Manzano (28)	Pulgón lanífero (<i>Eriosoma lanigerum</i>) Escama de San José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	5 ml/100L de agua
Alfalfa (10)	Pulgón manchado (<i>Therioaphis maculata</i>) Pulgón verde (<i>Acyrtosiphon pisum</i>)	1.0
Algodonero (14)	Pulgones (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>) Picudo (<i>Anthonomus grandis</i>) Pulga saltona (<i>Pseudatomoscelis seriatus</i> , <i>Spanagonicus albofasciatus</i>) Chinche (<i>Chlorochroa ligata</i> , <i>Euschistus servus</i>) Chinche verde (<i>Nezara viridula</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> spp., <i>Trips tabaci</i>) Grillos (<i>Acheta assimilis</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Chinches (<i>Lygus</i> spp., <i>Creontiades</i> spp.)	1.0 - 1.5

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!



Insecticida / Concentrado Emulsionable

Insecticida Agrícola RSCO-INAC-0124-020-009-038

Cultivo	Plaga	Dosis (L/ha)
Frijol Chicharo (21)	Chicharritas (<i>Empoasca fabae</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> spp., <i>Caliothrips phaseoli</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia Tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>) Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp.)	0.75-1.0
Maíz, (14) Trigo, (60) Sorgo, (28)	Pulgones (<i>Rhopalosiphum maidis</i> , <i>Schizaphis graminum</i>) Trips (<i>Frankliniella</i> spp.) Araña roja (<i>Oligonychus mexicanus</i>) Chicharritas (<i>Dalbulus maidis</i> , <i>D. elimatus</i>)	0.75-1.0
Espinaca (14)	Pulgones (<i>Aphis</i> spp.) Minador de la hoja (<i>Liriomyza</i> spp.)	0.5
Apio, Brócoli (7) Col (3) Coliflor (1)	Pulgones (<i>Aphis</i> spp.) Chinche lygus (<i>Lygus lineolaris</i>) Pulgón de la Col (<i>Brevicoryne brassicae</i>) Chinche arlequín (<i>Murgantia histrionica</i>)	0.75-1.0

() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Presentaciones en envase de PET de 240 ml, 950 ml y garrafas HDPE 5 L