

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Funlate



benomilo

50% PH

Fungicida / Polvo Humectable

Fungicida agrícola RSCO-FUNG-0303-336-002-050

FUNLATE 50® es un fungicida formulado a base de Benomilo perteneciente al grupo químico de los Benzimidazoles el cual tiene acción sistémica de absorción radical y foliar, traslocación principalmente acrópeta y actividad fungicida por contacto: preventiva y curativa, presentado en forma de polvo humectable para aplicar en aspersión foliar.

FUNLATE 50® actúa sobre la tubulina de las células, una proteína que se encuentra en el citoplasma que es vital para la división celular (mitosis). Al impedir la mitosis detiene el desarrollo del hongo, desde la germinación de la espora, crecimiento de micelio, apresorios y haustorios.

Una vez que **FUNLATE 50®** es absorbido por la planta el producto se metaboliza en dos productos: MBC (carbendazim) y Butilisocianato, el MBC se encarga de mantener el efecto antimicótico impidiendo cualquier tipo de desarrollo del hongo. El Butilisocianato actúa como un fuerte inhibidor de la oxidación de la glucosa y del acetato impidiendo la respiración celular. Ambos metabolitos tienen actividad fungitóxica.

Resulta eficaz en el control preventivo y curativo de antracnosis, botritis, cenicillas, negrillas o fumaginas, manchas foliares, moho gris, pudriciones radicales, sigatokas y otras enfermedades de origen fúngico, en cultivos como: aguacate, apio, arroz, cacahuate, calabaza, melón, pepino, durazno, fresa, frijol, jitomate, cítricos, mango, rosal, soya, plátano y bulbos de ornamentales.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Bulbo de ornamentales (SL)	Pudrición Radical (<i>Fusarium Spp</i>)	100 g/100 L de agua
() Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada: 24 horas después de la aplicación.		

Presentación: Bolsa de 100, 250 y 500 gr.