

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*



## **Herbicida agrícola** **REG. RSCO-HEDE-0249-005-009-035**

**LANZA 360®** es un herbicida selectivo de contacto de rápida acción, de amplio espectro, para uso de aplicaciones en pos-emergencia, para uso en cultivos de arroz, aplicado al follaje de las malezas afecta las hojas y partes verdes jóvenes; posee un amplio espectro de control de malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas.

**LANZA 360®** es un herbicida foliar pos-emergente, actúa por contacto con las hojas y las partes verdes jóvenes de las malezas, afecta los procesos fotosintéticos, inhibiendo el fotosistema II, provoca manchas cloróticas que luego se necrosan, posee sistemia muy limitada y puede afectar sistemicidad de productos en mezcla en dosis altas. Para ejercer un buen control de las malezas requiere de la presencia de luz y hojas activas.

Se recomienda **LANZA 360®** aplicar de preferencia en las primeras fases de desarrollo de las malezas (2 a 6 hojas) y nunca cuando tengan más de 8 a 10 cm de altura, para evitar residuos en el arroz al tiempo de la cosecha, no se deben efectuar aplicaciones durante 56 días anteriores a la cosecha, y no se use más de 20 litros del producto por hectárea, desde la siembra hasta la cosecha.

Al utilizar **LANZA 360®** se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros plaguicidas a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®



# Lanza

**Propanil**

**360 CE**

Herbicida / Concentrado Emulsionable

**Herbicida agrícola**

**REG. RSCO-HEDE-0249-005-009-035**

| Nombre Común             | Nombre Científico           | Nombre Común        | Nombre Científico        |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Fresadilla               | Digitaria sanguinalis       | Bolsa de pastor     | Capsella bursa- pastoris |
| Muela de caballo         | Brachiaria spp              | Quelite             | Chenopodium álbum        |
| Zacate de agua           | Echinochloa crus- galli     | Lengua de gato      | Galeopsis tathahit       |
| Cola de ardilla o capini | Echinochloa cruz- panovis   | Sanguinaria         | Polygonum aviculare      |
| Mazorquillo              | Ischaemum rugosum           | Gloria de la mañana | Polygonum convolvulus    |
| Hierba de pará           | Panicum purpurascens        | Pimientilla         | Polygonum persicarioides |
| Milo de texas            | Panicum texanum             | Lengua de vaca      | Rumex crispus            |
| Añil rizado              | Aschynomene virginica       | Ortiga menor        | Urtica urens             |
| Hierba de lagarto        | Alternanthera philoxeroides | Guachapori          | Xanthium spp             |
| Bledo rojo               | Amaranthus philoxeroides    | Coquillo            | Cyperus spp              |
| Mostaza silvestre        | Brassica hirta              | Espiga de pantano   | Eleocharis párvula       |
| Arrocillo                | Fimbristylis miliaceae      |                     |                          |

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*



**Herbicida agrícola**  
**REG. RSCO-HEDE-0249-005-009-035**

| Cultivo       | Dosis L/ Ha | Observaciones   |
|---------------|-------------|---|
| Arroz<br>(56) | 8.0         | Aplique cuando la maleza está en sus primeras etapas de desarrollo, cuando la maleza no haya crecido más de 8 a 10 centímetros de altura. |
|               | 15.0        | Aplique cuando la maleza está creciendo vigorosamente.  |

- ( ) Intervalo de seguridad
- Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de la aplicación.

Presentaciones en envase PET de 950 ml y garrafas de HDPE de 5L.