

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Metaron

Malation

4% P

Insecticida / Polvo

Insecticida Agrícola en Polvo RSCO-INAC-0143-045-001-00

Metaron 4% P® Insecticida y acaricida organofosforado con actividad por contacto, ingestión e inhalación, de gran efecto de choque presentado como polvo seco para ser aplicado como viene. Resulta efectivo en el control de chinches, escamas, pulgones, trips, gusanos y palomillas, moscas, pulgas saltonas, picudos y ácaro.

Metaron 4% P® Interfiere la transmisión de los impulsos nerviosos por inhibición de la colinesterasa (provocando la muerte del insecto).

Al utilizar **Metaron 4% P®** se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros plaguicidas a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

Puede ser utilizado en el control de las plagas que se citan en los siguientes menos cultivos autorizados a más:

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Metaron

Malation

4% P

Insecticida / Polvo

Insecticida Agrícola en Polvo
RSCO-INAC-0143-045-001-00

Cultivo	Plaga (Nombre científico)	Dosis (L/ha)
Algodonero (SL)	Chinche Apestosa (<i>Eushistus spp</i>) Chinche Manchadora (<i>Dysdercus spp.</i>) Chinche Verde (<i>Nezara viridula</i>) Medidor de la Hoja (<i>Alabama argillacea</i>) Picudo del Algodonero (<i>Anthonomus grandis</i>) Pulgón del Algodón (<i>Aphis gossypii</i>)	25
Jitomate (3)	Chicharrita (<i>Eutettix tene_us</i>) Pulga Saltona (<i>Epitrix spp.</i>) Trips (<i>Frankiniella spp.</i>)	10-20
Frijol (1)	Conchuela del Frijol (<i>Epilachna varivestis</i>) Chinche Ligus (<i>Lygus spp.</i>)	10-20
Papa (SL)	Catarinita de la Papa (<i>Leptinotarsa undecemlineata</i>) Chicharrita (<i>Empoasca spp.</i>) Pulgón de la Papa (<i>Macrosiphum solanifolii</i>)	10-20

FICHA TÉCNICA



Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Metaron

Malation

4% P

Insecticida / Polvo

Insecticida Agrícola en Polvo
RSCO-INAC-0143-045-001-00

Cultivo	Plaga (Nombre científico)	Dosis (Kg/ton)
Maiz (60 Grano) (SL semilla)	Gorgojo de los granos (<i>Sitophilus oryzae</i>)	0.5-1.0
Sorgo (60 Grano) (SL semilla)	Gorgojo de los granos (<i>Sitophilus oryzae</i>)	0.5-1.0
Melon (1)	Barrenador del Melón (<i>Diaphania hyalinata</i>) Diabrotica (<i>Diabrotica spp.</i>) Pulga saltona negra (<i>Epitrix spp.</i>) Pulgón del Melón (<i>Aphis gossypii</i>)	20

(1) Intervalo de seguridad
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 72 horas des pues de la aplicación
Presentación: Envases de 1kg