

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®



**myclobutanil**

**40% PH**

Fungicida / Polvo Humectable

## Fungicida Agrícola

**RSCO-FUNG-0351-001-002-040**

**Mytanil 40®** es un fungicida de actividad sistémica a base del ingrediente activo Myclobutanil con 400 g de i. a. / kg de producto comercial, pertenece a la familia de los Triazoles. Se caracteriza por su actividad curativa y preventiva demostrando ser eficaz y seguro para el control de Alternarias, Royas y Cenicillas Polvorientas entre otras enfermedades.

**Mytanil 40®** es utilizado como preventivo, impide la germinación de la espora y la penetración del hongo, evitando que se produzcan daños en la planta. Cuando la enfermedad ya se encuentra presente o en estado de incubación Mytanil impide el desarrollo por completo. Es efectivo para el control de cenicilla polvorienta, alternaría, roya y roña en una variedad de cultivos. Ofrece menor número de aplicaciones ya que tiene un rango de protección de 14 días.

**INCOMPATIBILIDAD:** **Mytanil 40®** puede ser mezclado con otros plaguicidas registrados en los cultivos indicados, no obstante se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretenden mezclar.

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®

 **Mytanyl**

**myclobutanil**

**40% PH**

Fungicida / Polvo Humectable

## Fungicida Agrícola

**RSCO-FUNG-0351-001-002-040**

Cultivo	Enfermedad	Dosis (g/Ha)	Recomendaciones
Manzano (14)	Roña ( <i>Venturia inaequalis</i> ) Cenicilla ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	12 -15 / 100L agua	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%.
Crisantemo (SL)	Roya Blanca ( <i>Puccinia horiana</i> )	20 - 40 / 100L agua	
Vid (14)	Cenicilla ( <i>Uncinula necator</i> ) Pudrición amarga ( <i>Guignardia bidwelli</i> )	228	
Jitomate, Tomate de cáscara, Chile(1)	Cenicilla ( <i>Leveillula taurica</i> )		
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía(0)	Cenicilla ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )		

# FICHA TÉCNICA



Sifatec  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®



# Mytaniil

myclobutanil

40% PH

Fungicida / Polvo Humectable

## Fungicida Agrícola

RSCO-FUNG-0351-001-002-040

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)	Recomendaciones
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía, Chayote (0)	Tizón foliar ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	228	Realizar dos aspersiones al follaje a intervalos de 14 días. Iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas. Volumen de aplicación 400 L/ha
Frambuesa roja, Zarzamora, Arándano azul, Arándano rojo, Fresa (0)	Cenicilla polvorienta ( <i>Sphaerotheca macularis</i> )	228	Para aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%. Aplicaciones cada 7 días con un máximo por ciclo de 4 aplicaciones. Volumen de aplicación 1200 L/ha.
Cebolla, Cebollín, Ajo, Poró	Mancha púrpura ( <i>Alternaria porri</i> )	220-342	Realizar tres aspersiones al follaje a intervalos de 7 días. Volumen de aplicación 350 L/ha.

(0) Intervalo de seguridad

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de la aplicación.

Presentación: Envase de 500 gr y 1 kg.