

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®

# Propitil

propiconazol 250 CE

Fungicida / Concentrado Emulsionable

## Herbicida agrícola RSCO-FUNG-0333-302-009-023

**PROPITIL 250®** es un fungicida sistémico perteneciente a la familia de los triazoles que controla enfermedades como cenicillas, royas, manchas foliares y carbones que atacan a los cultivos de trigo, cebada, plátano, nogal, clavel y rosal.

Se absorbe y se trasloca rápidamente después de haber sido aplicado. Esto evita la pérdida del producto e incrementa su acción curativa y preventiva, logrando permanecer más tiempo dentro de las plantas. Los mejores resultados se obtienen si este producto es aplicado en forma preventiva o cuando la enfermedad está en sus primeras fases de desarrollo.

**PROPITIL 250®** actúa de manera sistémica; penetra por las hojas, se mueve ampliamente en el interior de ellas, tiende a acumularse en los extremos apicales. Brinda protección al tejido nuevo producido después de la aplicación; tiene ligera acción por fase de vapor.

Al utilizar **PROPITIL 250®** se recomienda realizar una prueba de compatibilidad con otros plaguicidas a pequeña escala bajo la responsabilidad del usuario para observar los aspectos físicos antes de realizar las mezclas para aplicación; sin embargo, es necesario que la mezcla sólo se haga con productos debidamente registrados por COFEPRIS.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	USO
Trigo (30)	Roya anaranjada ( <i>Puccinia recondita</i> ) Cenicilla polvorienta ( <i>Erysiphe graminis</i> ) Carbón parcial ( <i>Neovossia indica</i> )	0.5	Para controlar roya y cenicilla, aplicar cuando se observen los primeros síntomas y las condiciones sean favorables para su desarrollo. Para carbón parcial, cuando se tenga un 10% de espigamiento.
Nogal (28)	Pudrición texana, ( <i>Phymatotrichum omnivorum</i> )	50 ml/100 L de agua	Haga una cuadrícula cada 80 cm en el área de sombreado del árbol, inyecte 2.5 L de solución cada 80 cm de la cuadrícula a una profundidad de 60 a 80 cm. Adicione 50 ml de un dispersante por cada 100 L de agua. La aplicación debe realizarse cuando se noten los primeros síntomas en aplicación a cada árbol afectado. Aplique al inicio de la época calurosa (abril). Repita la aplicación en agosto si es necesario.

# FICHA TÉCNICA



**Sifatec**  
*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

Sifatec®

# Propitil

propiconazol 250 CE

Fungicida / Concentrado Emulsionable

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	USO
Plátano (SL)	Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> var. <i>difformis</i> )  Sigatokaamarilla ( <i>Mycosphaerella usicola</i> )  Chamusco amarillo ( <i>Cercospora musae</i> )  Roña ( <i>Cladosporium spp</i> )	0.4 Adicionar 2 litros de citrolina agrícola	Realizar de 6 a 8 aplicaciones máximo por temporadas, en 2 bloques de 3 a 4 aplicaciones seguidas, a intervalos de 21 días intercalando 2 aplicaciones de productos de diferente modo de acción entre los dos bloques. También pueden hacerse 3 bloques de 2 a 3 aplicaciones cada uno, intercalados con otros productos. Cambiar de <b>Propitil 250®</b> a un producto de contacto.
Cebada (SL)	Roya amarilla ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Mancha de la hoja ( <i>Pyrenophora teres</i> ) Escaldadura ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Cenicilla. ( <i>Erysiphe spp.</i> ) Mancha de la hoja ( <i>Septoria spp.</i> )	0.5	Aplique cuando la planta empieza a emerger la hoja bandera, o cuando los primeros síntomas aparezcan y las condiciones sean favorables al desarrollo de la enfermedad. Prefiera las aplicaciones tempranas ya que favorecen el rendimiento.
Ornamentales (SL)	Cenicilla ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )  Roya ( <i>Uromyces caryophyllinus</i> )	50 ml/100 L de agua	Se recomienda aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad y repetir tres veces la aplicación en intervalos de 7 a 10 días. Intercalándolo con otros productos de diferente modo de acción.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación.

Presentación: Envases de PET de 240 y 950 mL