

“USO AGRÍCOLA”

LUCAMBDA

70 CE

lambda cyhalotrina

Concentrado Emulsionable

Insecticida

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Lambda cialotrina: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 70 g de i.a./L a 20°C)	7.80
INGREDIENTES INERTES:	
Emulsificantes y disolvente	92.20
TOTAL	100.00

No. de Registro: RSCO-INAC-0177-X0073-009-7.80



Tóxico si se inhala



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

LUCAMBDA 70 CE es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Es recomendado su uso en el combate y control de las plagas en los cultivos autorizados:



Cultivos	Plagas (Nombre Científico)	Dosis (ml/ha)	Observaciones
Aguacate (14)	Trips (<i>Frankliniella spp</i>)	300-500	Realizar dos aplicaciones al follaje al detectar los primeros brotes de la plaga a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 730-830 L de agua/ha.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas () INTERVALO DE SEGURIDAD: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.			

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Utilice el equipo de protección indicado en la sección de PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad recomendada de **LUCAMBDA 70 CE** con ayuda de una probeta, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.

La aplicación foliar puede ser realizada con equipo de mochila manual o de motor, montado al tractor, el cual debe ser calibrado para aplicar la dosis recomendada en el volumen de agua calculado y en la superficie correspondiente.

CONTRAINDICACIONES: Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de mañana. No se aplique en horas de calor intenso ni cuando el viento sea fuerte (mayor a 15 km/hora) o cuando exista una alta probabilidad de lluvia próxima que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD: **LUCAMBDA 70 CE** no es fitotóxico para los cultivos aquí indicados si es aplicado siguiendo las instrucciones de uso de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **LUCAMBDA 70 CE** con otros productos agroquímicos.

“MANEJO DE RESISTENCIA”: “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

