

“USO AGRÍCOLA”

# PROYECTIL 50 PH benomilo

**Polvo Humectable**  
**Fungicida**

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
<b>Benomilo:</b> Metil 1-(butilcarbamoil) bencimidazol-2-il carbamato. (Equivalente a 500 g de i.a./kg).	50.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Diluyente, humectante, dispersante y compuestos realcionados	50.00
<b>Total</b>	<b>100.00</b>

No. de Registro: RSCO-FUNG-0303-003-002-050



**Nocivo en caso de ingestión**  
**Nocivo por el contacto con la piel**  
**Nocivo si se inhala**



“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

Este producto es un fungicida sistémico preventivo y curativo recomendado para el control de enfermedades en los cultivos especificados en esta etiqueta. Es más efectivo en etapas tempranas del desarrollo de la infección, cuando se presenta los primeros síntomas de la enfermedad.



CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (g/ha)	LMR
Aguacatero (30)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	30-60 g /100 L de agua	0.5
	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>		
	Mancha de la hoja	<i>Cercospora purpurea</i>		
	Roña o sarna	<i>Sphaceloma perseae</i>		
Apio (7)	Tizón o mancha foliar	<i>Septoria apii</i>	200-250	3.0
	Tizón temprano	<i>Cercospora apii</i>		
Ciruelo (SL)	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	15.0
	Pudrición del fruto	<i>Monilinia fructicola</i>		
	Roña	<i>Venturia cerasi</i>		
CÍTRICOS (1) Limonero, Mandarino, Naranja, Toronjo	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	60-90 g/ 100 L de agua	10.0
	Cenicilla	<i>Oidium tingitaninum</i>		
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		
Col (SL)	Pudrición de raíz y tallo	<i>Sclerotinia sp.</i>	1200	0.2
CUCURBITÁCEAS (SL) Calabacita, Melón, Pepino	Antracnosis	<i>Colletotrichum lagenarium</i>	300-350	
	Cenicilla	<i>Erysiphe cichoracearum</i>		
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		
	Pudrición gomosa	<i>Mycosphaerella citrulina</i>		
Durazno (SL)	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	15.0
	Pudrición del fruto	<i>Monilinia fructicola</i>		
	Roña	<i>Cladosporium carpophilum</i>		
	Tiro de munición	<i>Coryneum beijerinckii</i>		
Fresa (SL)	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	250-350	5.0
	Mancha de la hoja	<i>Mycosphaerella fragariae</i>		
Frijol (14)	Antracnosis	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	300- 500	2.0
	Moho blanco	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>		
	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>		
Jitomate (1)	Antracnosis	<i>Colletotrichum phomoides</i>	400-500	5.0
	Mancha de la hoja	<i>Septoria lycopersici</i>		
	Moho gris	<i>Cladosporium fulvum</i>		
	Pudrición del fruto	<i>Botrytis cinerea</i>		
Mango (14)	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	40-60 g/100 L de agua	3.0
	Cenicilla	<i>Oidium spp.</i>		
	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>		
Manzano	Fumagina	<i>Capnodium spp.</i>	60-90 g/ 100 L de agua	7.0
	Pudrición amarga	<i>Glomerella cingulata</i>		
	Roña	<i>Venturia inaequalis</i>		

